

## แนวทางการปฏิบัติงานและการสื่อสารสำหรับยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drug)

### แนวทางการสั่งจ่าย

#### การเขียนคำสั่งจ่าย

1. เขียนคำสั่งจ่ายด้วย **ชื่อเต็ม** โดยใช้ชื่อสามัญทางยา หรือชื่อการค้า หรือชื่อพ้อง ตามที่กำหนดไว้

ชื่อสามัญทางยา	ชื่อการค้าหรือชื่อพ้อง
Digoxin	Lanoxin
Lidocain	Xylocain
Dobutamine	Dobutrex
Norepinephrine	Levophed
Epinephrine	Adrenaline
Warfarin	Coumadin
Enoxaparin	Clexane
Phenytoin	Dilantin
Diazepam	Valium
Midazolam	Dormicum
Methylergometrine	Methergin
Sulprostone	Nalador
Misoprosal	Cytotec
Terbutaline	Bricanyl

2. เขียนคำสั่งจ่ายโดยระบุรายละเอียด ขนาดยา วิธีใช้ วิธีการให้ยา ตามแนวทางการสั่งจ่ายของโรงพยาบาลกุมภวาปี

#### การสั่งจ่ายด้วยวาจา

ไม่ควรสั่งจ่ายด้วยวาจา ยกเว้นกรณีฉุกเฉินและกรณีที่ไม่สามารถเขียนคำสั่งจ่ายได้

#### กรณีฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย

เมื่อแพทย์สั่งจ่ายด้วยวาจา ให้พยาบาลทวนชื่อยาและคำสั่งแพทย์โดยการออกเสียงก่อนหยิบยาจากรถ emergency และมีพยาบาลอีก 1 คน ทวนชื่อยาและคำสั่งแพทย์โดยการออกเสียงอีกครั้ง พร้อมจดบันทึกชื่อยา ขนาดยา และจำนวนที่ใช้ หลังจากนั้นแพทย์เขียนคำสั่งจ่ายพร้อมลงชื่อกำกับทุกครั้ง

### กรณีสั่งใช้ยาด้วยวาจาทางโทรศัพท์

ให้ระบุรายละเอียดชื่อยา ขนาดยา วิธีการให้ยา เช่น เกี่ยวกับการเขียนคำสั่งใช้ยา พยาบาลผู้รับคำสั่งใช้ยาทางโทรศัพท์ต้องบันทึกรายละเอียดลงใน Doctor's order และมีการทวนคำสั่งแพทย์ทุกครั้ง หลังจากนั้นแพทย์ต้องลงชื่อกำกับคำสั่งใช้ยาภายใน 24 ชั่วโมง

### แนวทางการเก็บรักษา

1. ติดสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ High Alert Drug สีแดงบริเวณป้ายชื่อยา และที่ยาทุกรายการ
2. เมื่อพบสัญลักษณ์ดังกล่าว ผู้หยาบยาและเติมยาต้องตรวจสอบชนิดและขนาดยาอย่างระมัดระวัง กรณียาความเสี่ยงสูงที่มีการสำรองบนหอผู้ป่วย หรือบนรถemergency ผู้ที่สามารถหยาบยาและเติมยาได้ ต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพเท่านั้น

### แนวทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน

1. ยาความเสี่ยงสูงจะมีสัญลักษณ์ ##### หลังชื่อยา เมื่อปรากฏสัญลักษณ์ดังกล่าวหลังชื่อยาใน คอมพิวเตอร์ ผู้สั่งใช้ยาต้องสั่งใช้ยาด้วยความระมัดระวัง กรณีนอกเวลาราชการ พยาบาลต้องปรึกษา แพทย์ทุกครั้ง เพื่อให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่าย
2. กรณีผู้ป่วยใน
  - Doctor's order ติดสติ๊กเกอร์ High Alert Drug สีแดง ในช่อง progress note บนส่วนล่างสุดของ Doctor's order ที่มีคำสั่งใช้ยาความเสี่ยงสูง
  - Medication sheet ติดสติ๊กเกอร์ High Alert Drug สีแดง ได้ชื่อยาความเสี่ยงสูง
  - Chart ผู้ป่วย ติดสติ๊กเกอร์ High Alert Drug สีแดง บน chart ผู้ป่วยที่มีการใช้ยาความเสี่ยงสูง
  - ชองยา ติดสติ๊กเกอร์ High Alert Drug สีแดง บนใบสั่งยา และหน้าชองยาความเสี่ยงสูง ยกเว้นชองยาที่มีการจ่ายให้ผู้ป่วยกลับบ้าน

### แนวทางการส่งมอบยาแก่ผู้ป่วยกลับบ้าน

1. กำหนดให้ เกสซกร เป็นผู้ส่งมอบยาแก่ผู้ป่วยโดยตรงเท่านั้น
2. มีฉลากยาซึ่งประกอบด้วย ชื่อสถานบริการ ชื่อผู้ป่วย วันที่จ่าย ชื่อสามัญทางยา ข้อบ่งใช้ วิธีใช้ ข้อควรระวัง และวันหมดอายุ
3. เกสซกรส่งมอบยาโดยอธิบายการใช้ยาและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยอย่างชัดเจน ทั้งโดยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดย
  - 1) แนบใบติดตามและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาความเสี่ยงสูงทุกครั้ง que ผู้ป่วยได้รับกลับบ้าน

2) อธิบายการใช้ประโยชน์จากใบติดตามและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากยาความเสี่ยงสูงด้วยวาจาทุกครั้ง โดยใช้เอกสารเป็นใบเตือนความจำ และทบทวนการใช้ยากับเอกสารแนบนี้ทุกครั้งที่ใช้ยา

3) ย้ำให้ผู้ป่วยนำใบติดตามและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาความเสี่ยงสูงกลับมาด้วยทุกครั้งที่มาโรงพยาบาล

\*\*\* กรณีผู้ป่วยไม่ได้นำใบติดตามและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาความเสี่ยงสูงกลับมารับบริการครั้งต่อไป เกสซ์กรจะเป็นผู้สอบถาม และติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาทุกครั้ง \*\*\*

#### แนวทางการเตรียมยาและการบริหารยา

1. พยาบาลหัวหน้าเวร เป็นผู้ตรวจสอบการระบุตัวผู้ป่วย ชื่อยา ขนาด ความแรง สารน้ำที่เข้ากันได้ ใน Doctor's order ก่อนคัดลอกคำสั่งแพทย์ลงใน medication sheet รวมถึงระบุรายละเอียดบนฉลากติดขวดสารน้ำกรณีเป็นยาความเสี่ยงสูงที่ต้องผสม และจัดยาไว้โดยตรวจสอบกับฉลากยาอีกครั้งหนึ่ง
2. พยาบาลผู้ให้ยา ตรวจสอบรายละเอียด การระบุตัวผู้ป่วย ชื่อยา ขนาด ความแรง สารน้ำที่เข้ากันได้ ใน medication sheet และฉลากยาซ้ำอีกครั้ง ก่อนเตรียมยาและให้ยาแก่ผู้ป่วย

#### แนวทางการติดตามการใช้ยา

1. พยาบาลเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยตามข้อมูลวิชาการ และบันทึกผลการใช้ยา หรือความเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วย
2. เมื่อพบความผิดปกติหรือความผิดพลาดจากการใช้ยาความเสี่ยงสูง ให้รายงานแพทย์ทันที และส่งรายงานตามระบบการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา และการรายงานความเสี่ยง