

Clozapine (โคล-ซา-ปีน)**C****หากพบอาการต่อไปนี้ ควรรีบมาพบแพทย์**

- ☐ ไข้ เจ็บคอ คล้ายเป็นหวัด
- ☐ ชีต
- ☐ หน้ามืด เป็นลม อ่อนเพลียอย่างมาก (โดยไม่ทราบสาเหตุ)
- ☐ หายใจติดขัด หายใจสั้นๆ
- ☐ ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ยานี้**(แจ้งแพทย์-เภสัชกรให้ทราบเมื่อมารับยาคราวหน้า)**

- ☐ ท้องผูก ☐ ปากแห้ง
- ☐ ง่วงซึม เวียนหัว ☐ คลื่นไส้อย่างมาก
- ☐ มีน้ำลายไหลมากผิดปกติ

คำแนะนำอื่นๆ

- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 - ระงับการลุก-นั่ง ลุกจากที่นอน เพราะอาจเกิดอาการความดันต่ำขณะเปลี่ยนท่าทาง
 - หลีกเลี่ยงการขับรถ ทำงานเครื่องจักรกล
 - อาจทำให้ปากแห้งได้ อาจอมลูกอมหรือเคี้ยวหมากฝรั่ง
- ***อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้เป็นเพียงข้อควรระวัง อาจเกิดหรือไม่ก็ได้ แต่หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ห้องยา รพ.กุมภวาปี โทร 042-334400 ต่อ 5103 หรือ 256

Lithium (ลิ-เทียม)**L****หากพบอาการต่อไปนี้ ควรรีบมาพบแพทย์**

- ☐ สั่น ชักกระตุก เดินเซ พุดไม่ชัด ตามัว
- ☐ ใจสั่นอย่างมาก
- ☐ คลื่นไส้ อาเจียนมาก อ่อนเพลียอย่างมาก
- ☐ ซึมลง

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ยานี้**(แจ้งแพทย์-เภสัชกรให้ทราบเมื่อมารับยาคราวหน้า)****ระยะแรก**

- ☐ ปัสสาวะบ่อย ☐ ปากแห้ง กระหายน้ำ
- ☐ มือสั่น ☐ คลื่นไส้ ปวดท้อง
- ☐ ผม่ว ☐ หน้าบวม ขอบเท้าบวม

ระยะยาว

- ☐ น้ำหนักเพิ่ม ☐ คิดช้าลง สมาธิสั้น

คำแนะนำอื่นๆ

- ห้ามปรับขนาดยาเองเด็ดขาด
 - หากท้องร่วงมาก ให้รีบมาพบแพทย์
 - หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์และให้นมบุตร
- ***อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้เป็นเพียงข้อควรระวัง อาจเกิดหรือไม่ก็ได้ แต่หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ห้องยา รพ.กุมภวาปี โทร 042-334400 ต่อ 5103 หรือ 256

Digoxin (ดิ-จ็อก-ซิน)**D****หากพบอาการต่อไปนี้ ควรรีบมาพบแพทย์**

- ☐ มองเห็นภาพเป็นสีเหลืองหรือเขียว
- ☐ อาเจียนรุนแรง
- ☐ เบื่ออาหาร อูจจาระร่วง
- ☐ หัวใจเต้นช้า เต้นผิดจังหวะ

(ชีพจรต่ำกว่า 60 ครั้งต่อนาที)

คำแนะนำอื่นๆ

- ห้ามปรับขนาดยาเองโดยเด็ดขาด
- หากท้องร่วง อาเจียนมาก ให้รีบมาพบแพทย์
- ควรกินอาหารที่มีโปแตสเซียมสูง ได้แก่กล้วย ส้ม มะเขือเทศอย่างสม่ำเสมอ
- ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม ไม่ควรขับรถ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
- ถ้าลืมกินยา ให้งดยามื้อนั้น และให้กินมื้อต่อไปตามปกติ ห้ามนำยามื้อที่ลืมมากินรวมกับมื้อถัดไป

***อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้เป็นเพียงข้อควรระวัง อาจเกิดหรือไม่ก็ได้ แต่หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ห้องยา รพ.กุมภวาปี โทร 042-334400 ต่อ 5103 หรือ 256

Cyclophosphamide (ไซ-โคล-ฟอส-ฟา-มาย) Cy**หากพบอาการต่อไปนี้ ควรรีบมาพบแพทย์**

- ☐ ปัสสาวะมีสีแดงจางๆ หรือปัสสาวะมีเลือดปน
- ☐ ไข้ เจ็บคอ

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ยานี้**(แจ้งแพทย์-เภสัชกรให้ทราบเมื่อมารับยาคราวหน้า)**

- ☐ ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ควรรับประทานพร้อมหรือหลังอาหารทันที
- ☐ ผม่ว (งอกใหม่ได้แม้จะยังได้รับยาอยู่)
- ☐ ยามีผลกดภูมิคุ้มกัน ระมัดระวังการติดเชื้อ หากเจ็บป่วย มีไข้ ควรแจ้งแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไป

คำแนะนำอื่นๆ

- ควรดื่มน้ำประมาณ 2-3 ลิตรต่อวัน และปัสสาวะทิ้งบ่อยๆ เพื่อลดอัตราการเกิดเลือดออกในกระเพาะปัสสาวะ
- รับประทานยาพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที เพื่อลดผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร
- อาจทำให้เป็นหมัน และเกิดผลเสียต่อทารกในครรภ์ ดังนั้นผู้ใช้นี้ควรคุมกำเนิด

***อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้เป็นเพียงข้อควรระวัง อาจเกิดหรือไม่ก็ได้ แต่หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ห้องยา รพ.กุมภวาปี โทร 042-334400 ต่อ 5103 หรือ 256

Methotrexate (เมท-โท-เทค-เสด)**M****หากพบอาการต่อไปนี้ ควรรีบมาพบแพทย์**

- ☐ ตัวเหลือง ตาเหลือง
 - ☐ ตาพร่า สายตาผิดปกติ หรือสูญเสียการมองเห็น
- อาการที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ยานี้**
(แจ้งแพทย์-เภสัชกรให้ทราบเมื่อมารับยาคราวหน้า)

- ☐ แพ้แสง ไวต่อแสง
- ☐ ผม่วรง
- ☐ อาเจียน เจ็บหน้าอก ท้องเสีย
- ☐ ภาวะเลือดจาง

คำแนะนำอื่นๆ

- รับประทานยาตอนท้องว่าง
 - ห้ามปรับขนาดยาเองโดยเด็ดขาด
 - หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 - ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับหรือภาวะเลือดจางขั้นรุนแรง หากท่านเกิดภาวะดังกล่าว ต้องแจ้งแพทย์
 - ยาทำให้เกิดผลเสียต่อทารกในครรภ์ ดังนั้นหญิงที่ใช้ยานี้ควรคุมกำเนิด
- ***อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้เป็นเพียงข้อควรระวัง อาจเกิดหรือไม่ก็ได้ แต่หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ**
ห้องยา รพ.กุ่มกวาปี โทร 042-334400 ต่อ 5103 หรือ 256

Warfarin (วาร์-ฟา-ริน)**W****หากพบอาการต่อไปนี้ ควรรีบมาพบแพทย์**

- ☐ เลือดออกผิดปกติ ได้แก่ ถ่ายดำ ปัสสาวะเป็นสีสนิมหรือสีเหมือนน้ำล้างเนื้อ ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะเป็นเลือด เป็นแผลแล้วเลือดไหลไม่หยุด
- ☐ ปวดหัวเฉียบพลัน เวียนหัว หน้ามืด
- ☐ แขนขาบวม
- ☐ หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก
- รู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียกว่าปกติ
- ☐ เบื่ออาหาร ทานข้าวไม่ได้หลายวัน
- ☐ ท้องเสียรุนแรง

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ยานี้**(แจ้งแพทย์-เภสัชกรให้ทราบเมื่อมารับยาคราวหน้า)**

- ☐ อาการเลือดออกเล็กน้อย เช่น เลือดออกตามไรฟัน มีเลือดออกเวลาแปรงฟัน มีเลือดกำเดา เกิดจ้ำเลือดตามผิวหนัง มีประจำเดือนมากผิดปกติ

คำแนะนำอื่นๆ

- แจ้งแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลและสถานพยาบาลอื่นๆ ทุกครั้ง ว่าท่านรับประทานยา วาร์ฟาริน อยู่
- ห้ามปรับขนาดยาเองโดยเด็ดขาด
- กินยาเวลาเดียวกันทุกวัน
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ควรกินผักใบเขียวในปริมาณสม่ำเสมอ เพราะผักใบเขียวมีวิตามินเคที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา
- ยาทำให้เกิดผลเสียต่อทารกในครรภ์ หากต้องการมีบุตรควรปรึกษาแพทย์
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการกระแทกหรือทำให้เกิดเลือดออก เช่น การนวด

*****หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ห้องยา รพ.กุ่มกวาปี โทร**

042-334400 ต่อ 5103 หรือ 256 ***

